

Bölcességfogak tünetei

A bölcességfogak általában 20 éves kor körül törnek elő. A bölcességfog körüli szövetek fájdalmas gyulladását pericoronitisnek nevezzük, amely gyakran erős panaszokat okoz.

A pericoronitis gyakran fordul elő fiataloknál és gyakrabban az alsó fogaknál.

Tünetei a fájdalom, duzzanat, kellemetlen szájíz, gennyképződés, szájzár vagy láz.

A gyulladt bölcességfog területének figyelmes és rendszeres tisztítása otthon egycsomós fogkefével, a rendelőben ultrahangos eszközzel, klórhexidines géllal csökkentheti a tüneteket. Ideiglenesen ajánlott klórhexidin tartalmú szájvízzel öblögetni. A tisztítás vérzéssel, fájdalommal jár. Ennek ellenére a gondozást folytatni kell. Tisztítás előtt fél órával javasolt vény nélkül kapható fájdalomcsillapítót bevenni.

Szükség esetén a kezelőorvos antibiotikumot is felírhat.

A végleges megoldás a bölcességfog eltávolítása, mely a legtöbb esetben a fog műtétes eltávolítását jelenti. A beavatkozás helyi érzéstelenítésben történik. A sebészi beavatkozás előtt szükséges lehet a normál röntgenfelvételen túl OPTG vagy CBCT felvétel is a rizikók csökkentésére.



6000 Kecskemét Piaristák tere 7. 104-es rendelő
+36 20 408 1683 +36 20 289 9851